## ROSA DUMETORUM.

R. ramis glabris; aculeis infra folia geminatis, validis, uncinatis: foliis pubescentibus; petiolo minute passim aculeato; foliolis suborbiculato-ovalibus 5-7; fructibus globosis pedunculisque glabris. Th. Fl. de Paris, éd. 2, p. 250. DC. Fl. franç. éd. 3, vol. 6, p. 554. Ait. Hort. Kew. epit. of the 2° ed. add. p. 373. Smith, Engl. Bot. Tab. 2579. RAU, En. Ros. p. 85.

R. (Canina) var. 8. Poir. Ency. 6, p. 288.

R. (Canina) var. 7. DC. l. c. vol. 4, 3716.

R. (Canina) var. B. Bast. Fl. M. et L. p. 189.

R. (Arvensis.) Wibel, Fl. Werth. p. 263.

R. (Collina.) Wallr. Ann. bot. p. 67. Exclusis synoymis plerisque. (Ex Rau, l. c.)

R. (Collina dumetorum.) Red. Roses, vol. 2, p. 14, var. 5.

## LE ROSIER DES BUISSONS.

## DESCRIPTION.

Arbrisseau assez commun dans les bois et dans les haies aux environs de Paris. On le trouve aussi dans les contrées septentrionales de l'Europe. Il s'élève, en un buisson rameux, à la hauteur de trois, de quatre, et souvent de six pieds. Ses rameaux, absolument glabres, sont armés d'aiguillons crochus, quelques-uns épars, mais presque toujours disposés deux par deux près des stipules. Les feuilles se composent de cinq, plus rarement de sept folioles ovales-arrondies, vertes et glabres en-dessus, plus pâles et tomenteuses en-dessous, en général